



MSU
MOSCOW
STATE UNIVERSITY
RESEARCH
COMPUTING CENTER



Модель деятельного слоя суши ИВМ РАН-МГУ (TerM): разработка и приложения в автономном режиме и в модели Земной системы

Степаненко В.М.^{1,2}, А.И.Медведев¹, В.Ю.Богомоллов^{3,1},
А.А.Рязанова^{3,1}, В.А.Ломов^{1,2}, А.Ю.Черненко⁴,
Г.М.Файкин¹, С.К.Шангареева^{5,1}, М.И.Варенцов¹,
М.А. Тарасова^{8,1}, В.И.Суязова¹, В.А.Романенко^{6,1},
А.Л.Энтин^{2,1}, И.М.Рыжова⁷

Задачи в рамках ВИП ГЗ


- Переработка программного кода к **модульной архитектуре**
- Профилировка и оптимизация **вычислительной эффективности**
- Программное обеспечение для подготовки **входных данных о параметрах подстилающей поверхности**
- Процедуры расчёта **эмиссии углекислого газа и метана** (1) управляемыми лесами, (2) искусственно-обводнёнными и искусственно осушенными территориями, (3) сельскохозяйственными территориями
- Усовершенствованная схема **углеродного и азотного цикла суши** (доклад А.Ю.Черненкова)
- Внедрение усовершенствованных блоков в МЗС ИВМ РАН

Carbon (CO₂) Budget


Atmosphere
591 + 279 ± 5




Average increase 5.1 ± 0.02



Methane (CH₄) Budget



Land surface in the Earth system models



Модель деятельного слоя суши ИВМ РАН-МГУ Terrestrial Model (TerM)




Чл.-корр. РАН В.Н.Лыкосов –
основатель направления



INM RAS-MSU land
surface scheme

Climate model
of Institute of
Numerical
Mathematics
(INMCM)

Global
numerical
weather
prediction SL-
AV model



Heat and moisture exchange in a cell
of INM RAS-MSU land surface model

- ❑ Heat, moisture, water vapor and ice dynamics in soil (23 lrs)
- ❑ Snow cover with liquid water treatment (4 lrs)
- ❑ Soil and vegetation carbon dynamics
- ❑ Wetland CH₄ model
- ❑ LAKE model
- ❑ River routing scheme

- (Marchuk, Dymnikov, Lykosov, 1981)
- (Володин и Лыкосов, 1998а,б)
- (Володин, 2008)

Модель реализована в автономном режиме (0.5°x0.5°)
с предписанным атмосферным воздействием

Разработка модели TerM для прогноза климата и углеродного цикла

Сценарные расчёты изменений **глобального климата с учётом обратных связей** в системе атмосфера-океан-криосфера-суша

- **Одноколоночные, региональные, глобальные расчёты**
- **Возможность использования высокого разрешения**
- **Возможность массовых расчётов для тестирования новых блоков/параметризаций**

Модель Земной системы ИВМ РАН



Модель деятельного слоя суши TerM




Передача новых блоков/параметризаций (2024 г. и 2030 г.)


Модель деятельного слоя суши TerM



Реанализ, данные метеонаблюдений или климатических моделей



Применение модели TerM для диагноза углеродного цикла



Диагноз пулов и потоков
углерода на суше

Национальная отчётность
(3 уровень Кадастра, ...)

Модель деятельного
слоя суши TerM

- + Законы сохранения
- + Расчёт пулов и потоков
- + Разрешение до 1-10 км
- «Модель есть модель»

Дистанционное
зондирование Земли

Валидация, калибровка

Наземные локальные
измерения

- + Полное покрытие с разрешением до 10-100 метров
- + Высокая точность получения ряда параметров
- Ограниченная возможность оценки пулов в почве, потоков углерода

Обратное
моделирование
переноса
климатически
активных газов

- + Высокая точность получения потоков и пулов углерода
- Низкая степень покрытия больших территорий

отсутствует


Обеспечение внешних данных о подстилающей поверхности (доклад А.А.Рязановой)

Задача — обеспечение блока деятельного слоя суши и модели климата данными о параметрах подстилающей поверхности.

Технические требования:

- Интерполяция на произвольную регулярную широтно-долготную сетку с сохранением инвариантов
- Скалярные поля-1: площадь типов поверхности — типы растительности, водоёмы, урбанизированные территории, ледники, маска «океан-суша». ...
- Скалярные поля-2: параметры растительности (листовой индекс и пр.), параметры почвы, глубина водоёмов, гипсометрические кривые, уклон речного дна, тип городской поверхности, ...
- Векторное поле: поле направлений речного стока
- Согласование скалярных и векторных полей на целевой сетке

Гранулометрический состав
в глобальной почвенной БД
(Dai et al., JAMES, 2019)




Уточнённая карта
растительности России
ИКИ РАН
(Егоров и др., 2018)



Карты городских
локальных климатических зон
(Demuzere et al., 2021)




Трассировка речного потока
(Reed, 2003)+ БД HydroSheds



Архитектура системы подготовки данных о параметрах поверхности TerMPS


Уровень 0: элементарные функции агрегирования данных

0 уровень




Уровень 1: агрегирование частных типов данных

1 уровень




Уровень 2: интерфейс пользователя

2 уровень




Результаты работы TerMPS

Объемное содержание глины



Dai, Y., Xin, Q., Wei, N., Zhang, Y., Shanguan, W., Yuan, H., et al. (2019). A global high-resolution data set of soil hydraulic and thermal properties for land surface modeling. *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 11, 2996– 3023. <https://doi.org/10.1029/2019MS001784>


Доля урбанизированной поверхности




Карта земного покрова России, составленная по данным спутника Proba-V.



V.A. Egorov, S.A. Bartalev, P.A. Kolbudaev, D.E. Plotnikov, S.A. Khvostikov, Land cover map of Russia derived from Proba-V satellite data, Current problems in remote sensing of the earth from space, 15(2), 2018




Направления речного стока




Данные по площади водохранилищ

Распределение небольших водохранилищ площадью (менее 100 км²) по данным Росреестра по субъектам РФ (данные представлены для 2016 года)




Распределение площади крупных Волжских водохранилищ на регулярную сетку модели деятельного слоя суши



Процедуры оценки эмиссии и поглощения парниковых газов водохранилищами

Модель термогидродинамики рек




- Модель диффузионной волны для гидродинамики
- Расчёт термического режима


Калибровка модели

SP-TRU


(Методы оптимизации Монте-Карло, ROPE, ...)



Рыбинское вдхр.




Куйбышевское вдхр.




Волгоградское вдхр.

Модель водоёма LAKE3.x

Термогидродинамика



Биогеохимия




- O₂, CH₄, CO₂ – концентрации и потоки
- Продукция, дыхание, разложение ...

Пузырьковый поток метана:


Калибровка модели водохранилищ

Этапы: 1. Оптимизация температуры 2. Оптимизация кислорода 3. Оптимизация метана





- 1 – наблюдения ---
- 2 – до калибровки и подбора правильного форсинга ---
- 3 – после калибровки ---



Ход калибровки параметров метановой модели



Примеры распределения станций натурных наблюдений в разные сезоны на Рыбинском водохранилище




Калибровка на данных 9 вдхр. (2024 г.)



ISIMIP2b simulations, lake sector

Simulations with LAKE model:

- 0.5 x 0.5 deg lon-lat grid
- global lake area and depth database (*Choulga et al., 2014*)
- climate forcing from models: GFDL, MIROC, HadESM, IPSL
- climate change scenarios: picontrol, historical, rcp26, rcp60, rcp85
- 100 cores/run
- 5-6 hours wall clock time per 10 years of simulation
- ~170 000 processor-hours of Lomonosov-2 supercomputer
- >100 Tb of output data




Geophysical Research Letters

Research Letter | [Open Access](#) | [CC](#) | [i](#)

Global Heat Uptake by Inland Waters

I. Vanderkelen [✉](#), N. P. M. van Lipzig, D. M. Lawrence, B. Droppers, M. Golub ... [See all authors](#) [v](#)

First published: 04 June 2020 | <https://doi.org/10.1029/2020GL087867>



ARTICLE

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22657-4> [OPEN](#)

Phenological shifts in lake stratification under climate change

R. Iestyn Woolway [ORCID](#)^{1,2}, Sapna Sharma [ORCID](#)³, Gesa A. Weyhenmeyer [ORCID](#)⁴, Andrey Debolskiy^{5,6,7}

Углеродный цикл суши

Уравнения углеродного цикла:


$$\frac{\partial C_{veg}}{\partial t} = F_{psn} - F_{plr} - \frac{C_{veg}}{\tau_{veg}} - F_{dfr,a} - F_{dfr,b}$$

$$\frac{\partial C_{soil}}{\partial t} = \frac{C_{veg}}{\tau_{veg}} - \frac{C_{soil}}{\tau_{soil}} - F_{ers}$$

$$\frac{\partial C_{soil,b}}{\partial t} = F_{dfr,a} + F_{dfr,b} + F_{ers} - \frac{C_{soil,b}}{\tau_{soil,b}}$$

Пул растительного углерода
рассчитывается в каждой ячейке
для каждого типа растительности:

- 1 лес сомкнутый лиственный вечнозеленый (тропические леса)
- 2 лес сомкнутый лиственный листопадный (широколиственные леса)
- 3 лес сомкнутый смешанный (смешанные леса)
- 4 лес сомкнутый хвойный вечнозеленый (тайга)
- 5 лес сомкнутый хвойный листопадный (лиственница)
- 6 лес разреженный (саванна, также мб болота)
- 7 травянистые сообщества (степь, луга)
- 8 кустарники сомкнутые (напр., средиземноморский кустарник)
- 9 кустарники разреженные (напр., полупустынный кустарник)
- 10 тундра — мхи и лишайники
- 11 тундра — кустарники и кустарнички
- 12 сельхозугодья — травянистые (пашня)
- 13 сельхозугодья — древесные (плодовые деревья)



Пулы:

Cveg — углерод в растительности

Csoil — углерод в почве

Csoil,b — еще один углерод в почве («быстрый»)

Генерация:

Fpsn — фотосинтез

Сток (поток в атмосферу*):

Fplr — дыхание растительности

Fmicr — микробное дыхание

Fmicr,b — микробное дыхание 2

Переходы между пулами:

Flit — отмирание и опад растительности

Fdfr — вырубка (двух типов: А и Б)

Fers — распашка почвы

Photosynthesis scheme: interpolation between limiting cases (CLM, INMCM, JULES, CABLE)

(Clark et al., 2011)

- GPP rate is a minimum of rates of three photosynthesis stages: (Farquhar model)

Michaelis-Menten expr.

Rubisco-limitation


$$W_c = \begin{cases} V_{\text{cmax}} \left(\frac{c_i - \Gamma}{c_i + K_c(1 + O_a/K_o)} \right) & \text{for C}_3 \text{ plants} \\ V_{\text{cmax}} & \text{for C}_4 \text{ plants} \end{cases}$$

light-limitation

$$W_l = \begin{cases} \alpha(1 - \omega) I_{\text{par}} \left(\frac{c_i - \Gamma}{c_i + 2\Gamma} \right) & \text{for C}_3 \text{ plants} \\ \alpha(1 - \omega) I_{\text{par}} & \text{for C}_4 \text{ plants} \end{cases}$$

transport of photosynthetic products

$$W_e = \begin{cases} 0.5 V_{\text{cmax}} & \text{for C}_3 \text{ plants} \\ 2 \times 10^4 V_{\text{cmax}} \frac{c_i}{P_*} & \text{for C}_4 \text{ plants} \end{cases}$$



$W = \min(W_c, W_l, W_e)$
or smoothed modification of min function

$$\beta_1 W_p^2 - W_p(W_c + W_l) + W_c W_l = 0$$



$$\beta_2 W^2 - W(W_p + W_e) + W_p W_e = 0$$

Углерод лесов

(Европейская территория России)

Данные дистанционного зондирования ИКИ РАН (MODIS),
углерод древостоя, $\text{кг}/\text{м}^2$

Результаты модели
TerM, $\text{кг}/\text{м}^2$, 2020 г.




Параметры расчета:

- 1991-2020 гг.;
- атмосферное воздействие – ERA5;
- данные ДЗЗ по объёму древесины переводились в С учётом плотности древесины $600 \text{ кг}/\text{м}^3$;
- результаты TerM – сумма по всем «высоким» типам растительности.

Коэф. простр. корреляции


$$r_{A-B} = 0.83$$

Углерод почвы (кг/м²) по данным модели INMCM и Zinke (1984)



Модель баланса углерода в болотах (Г.А.Александров, А.В.Елисеев, С.Н.Денисов)

Олиготрофное болото



Уровень грунтовых вод определяется высотой, шириной болота и годовой суммой «осадкам минус испарение»:

$$z_{GWL,i} = \min \left[\sqrt{\frac{rL_{peat,i}^2 \beta_i}{\gamma_{sat}}}, z_{peat,i} \right]$$

Тенденция C = опад минус дыхание:

$$\frac{\partial C_{peat,i}}{\partial t} = F_{lit} - F_{mcr,i}$$

Дыхание = сумма дыхания в аэробной и анаэробной зонах:



$$F_{mcr,i} = C_{peat,i} * \frac{(z_{peat,i} - z_{GWL,i})R_a + (z_{GWL,i} - z_{MS})R_c}{(z_{peat,i} - z_{MS})}$$

Высота центра болота пропорциональна запасам C:

$$z_{peat,i} = \frac{C_{peat,i}}{\rho_{C,peat}} + z_{MS}$$


Шаг модели по времени – 1 год

Простой пример: «осушение болота»



- расчёт 1000 лет с шагом 1 год
- опад $10 \text{ мкмоль С} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$
- «осадки минус испарение» принималась 400 мм/год в первые 500 лет эксперимента, и 100 мм/год во вторые 500 лет

Эффект осушения болота на эмиссию метана в модели ИВМ РАН-МГУ




- Метеорологические данные с 6.05.2022 по 06.09.2022, полученные на полигоне «Мухрино» Югорского государственного университета,
- **Эксперимент 1:** уровень болотных вод рассчитывался по уравнениям влагопереноса модели и составил 0 – ~10см,
- **Эксперимент 2:** уровень болотных вод задавался 2 м – типичное значение для осушенных болот Западной Сибири.

Углерод в болотах юга Сибири

по модели углерода болот ИФА РАН

(доклад В.Ю.Богомолова и соавт.)



- Разрешение 0.5°x0.5°

- Атмосферное воздействие – реанализ ERA5

Сельское хозяйство

Уравнения углеродного цикла:

$$\frac{\partial C_{veg}}{\partial t} = F_{psn} - F_{plr} - \frac{C_{veg}}{\tau_{veg}} - F_{dfr,a} - F_{dfr,b}$$

$$\frac{\partial C_{soil}}{\partial t} = \frac{C_{veg}}{\tau_{veg}} - \frac{C_{soil}}{\tau_{soil}} - F_{ers}$$

$$\frac{\partial C_{soil,b}}{\partial t} = F_{dfr,a} + F_{dfr,b} + F_{ers} - \frac{C_{soil,b}}{\tau_{soil,b}}$$

Пул растительного углерода рассчитывается в каждой ячейке для каждого типа растительности:

- 1 лес сомкнутый лиственный вечнозеленый (тропические леса)
- 2 лес сомкнутый лиственный листопадный (широколиственные леса)
- 3 лес сомкнутый смешанный (смешанные леса)
- 4 лес сомкнутый хвойный вечнозеленый (тайга)
- 5 лес сомкнутый хвойный листопадный (лиственница)
- 6 лес разреженный (саванна, также мб болота)
- 7 травянистые сообщества (степь, луга)
- 8 кустарники сомкнутые (напр., средиземноморский кустарник)
- 9 кустарники разреженные (напр., полупустынный кустарник)
- 10 тундра — мхи и лишайники
- 11 тундра — кустарники и кустарнички
- 12 сельхозугодья — травянистые (пашня)
- 13 сельхозугодья — древесные (плодовые деревья)

- В существующей схеме углеродного цикла есть тип растительности «с/х», однако его качество не тестировалось
- Тип «с/х» должен иметь параметры, индивидуальные для ключевых с/х культур
- Не хватает дат посева и сборки урожая
- Не хватает схем севооборота
- Нужна карта с/х культур

Модель SOCS (Soil Organic Carbon Saturation)

(Рыжова И.М. 2020-2022)

Дополнительный постулат – существование состояния насыщения гумифицированного органического углерода





$$\frac{dC_1}{dt} = I - (1 - r)kC_1 - rkC_1 \left(1 - \frac{C_2}{C_m}\right) + k_d C_2$$

$$\frac{dC_2}{dt} = rkC_1 \left(1 - \frac{C_2}{C_m}\right) - k_d C_2$$

- C_1 – углерод свободного (незащищенного) вещества почвы;
- C_2 – углерод защищенного вещества почвы;
- C_m – максимальное количество органического углерода;
- I – поступление органического углерода в почву;
- r – доля углерода, переходящая в защищенное вещество;
- k – коэффициент скорости разложения C_1 ;
- k_d – коэффициент перехода углерода из C_2 в C_1 в результате десорбции и разрушения агрегатов.

Калибрована для сельскохозяйственных почв!

Многолетняя динамика углерода в пахотных землях (опытная станция ДАОСЗ, Подмосковье)



- Поступление органики – измеренные растительные остатки и органические удобрения

Конструктор модели углеродного цикла (доклад А.И.Медведева)


Функциональность:

- задаётся произвольное число пулов углерода в почве и растительности с атрибутами и графом переходов,
- переходы – произведение функций из набора стандартных типов: линейные, Михаэлис-Ментен, и т.д.,
- возможность введения переходов нестандартного вида,
- модель должна воспроизводить интегральные и вертикально-распределённые пулы в почве.

Обобщённая система уравнений конструктора:

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = -\frac{\partial(wC_i)}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial C_i}{\partial z} \right) + \sum_{j=1, j \neq i}^{N_{soil} + N_{veg}} F_{j \rightarrow i} - \sum_{j=1, j \neq i}^{N_{soil} + N_{veg}} F_{i \rightarrow j},$$


$$\frac{\partial C_i}{\partial t} = \sum_{j=1, j \neq i}^{N_{soil} + N_{veg}} F_{j \rightarrow i} - \sum_{j=1, j \neq i}^{N_{soil} + N_{veg}} F_{i \rightarrow j}.$$



Модели, протестированные в рамках рабочего прототипа конструктора:

- ✓ Линейная модель ИВМ РАН (SiB)
- ✓ Модель с квадратичной нелинейностью (И.М.Рыжова)

Расчёты по модели И.М.Рыжовой



Модель пожаров

- Формулировка модели лесных пожаров модели CLM4.0 (Thornton et al., 2010)

- Площадь пожаров = число пожаров * средняя площадь пожара
- Число пожаров (число возгораний * факторы):

$$N_f = N_i f_b f_m f_{se}$$

- Частота возгораний = молнии + «человеческий фактор»:

$$N_i = (I_n + I_a)$$


- Площадь среднего пожара:

$$a^* = \frac{\pi u_p^2 \tau^2}{4 L_B} \left(1 + \frac{1}{H_B} \right)^2$$





- Скорость распространения пожара определяется скоростью ветра, количеством и горючестью органики:

$$u_p = u_{max} C_m g(W)$$

Ячейка модели




Эксперименты на чувствительность автономной модели пожаров к входным переменным



Модель включается в блок деятельного слоя ИВМ РАН-МГУ ...

Влияние урбанизации на общую циркуляцию атмосферы




Chen et al. (2016).

Large-scale urbanization effects on eastern Asian summer monsoon circulation and climate

Модели городского полога

(доклад М.И.Варенцова)



Town Energy Balance (TEB)
[Masson, 2000]

- Физические процессы моделируются внутри **городского каньона**;
- Уравнения теплового баланса решаются отдельно для поверхности **крыши, дороги и стены**;
- Позволяют учитывать **антропогенные потоки тепла**, городскую растительность, «**зеленые крыши**» и др.
- Могут применяться для оценки **метеорологической комфортности** внутри города

Статус внедрений компонент в TerM и INMCM





	Разработка/тесты в автономном режиме	Внедрение и тесты в TerM	Внедрение и тесты в INMCM
Система препроцессинга TerMPS	+	+	
Модель озера LAKE	+	+	+/-
Модель водохранилищ LAKE-C	+		
Модель пожаров	+		
Модель С болот ИФА РАН	+	+/-	
Модель С сельского хозяйства	+/-		
Модель городского полога TEB	+		

Спасибо за внимание!

Текущие работы (до конца 2023 г.)



- Модель пожаров (из модели CLM)
- Модель торфонакопления в болотах ИФА РАН
- Рабочий прототип модели азотного цикла

Эксперименты на чувствительность автономной модели пожаров к входным переменным



- Использование вырубок по данным Рослесхоза в углеродной модели
- Введение площадей управляемых и резервных лесов

Василий Богомолов и соавт.
«Моделирование
теплообмена и потоков
метана в болотных экосистемах».
Секция Консорциума 4.



Команда




- Статистика
- Фото

Углерод в растительности

Данные ДЗЗ ИКИ РАН по запасу
стволовой древесины
(mean = 4.28 кг/м²)

TerM: начальное условие –
контрольная точка
климатической модели
(mean = 4.61 кг/м²)

TerM: распределение к 2020 г.
(mean = 6.30 кг/м²)



Параметры расчета:

- 1991-2020 гг.;
- атмосферное воздействие -- ERA5;
- Данные ДЗЗ по объёму древесины переводились в С
учётом плотности древесины 600 кг/м³;
- Данные TerM – сумма по всем типам растительности;

$$r_{A-B} = 0.83$$

